

### Suivi bactériologique

|                                     | 28 mai | 15 juin | 29 juin | 15 juil. | 27 juil. | 10 août | 25 août | 07 sept. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|
|                                     | 11:12  | 14:14   | 12:47   | 14:02    | 11h44    | 15:08   | 12:51   | 12:24    |
| Entérocoques (n/100 mL)             | 15     | <15     | <15     | <15      | <15      | <15     | 15      | <15      |
| Escherichia Coli (n/100 mL)         | <15    | 15      | 15      | 30       | <15      | <15     | 15      | <15      |
| Interprétation sanitaire ponctuelle |        |         |         |          |          |         |         |          |

 Eau de bonne qualité  
 Eau de qualité moyenne  
 Eau de mauvaise qualité

A l'issue de chaque saison touristique, un classement sanitaire de la baignade est réalisé. Il est basé sur l'analyse statistique des résultats bactériologiques de l'année écoulée et des 3 années précédentes.

Classement sanitaire européen 2025



Eau d'excellente qualité

### Suivi des cyanobactéries

|                                  | Valeurs guides      | 28 mai | 15 juin | 29 juin | 15 juil. | 21 juil. | 04 août | 10 août | 25 août | 03 sept. | 07 sept. |
|----------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Chlorophylle A (µg/L)            | 10 µg/L             | 9      | <2      | 18      | N.M.     | N.M.     | N.M.    | N.M.    | N.M.    | N.M.     | N.M.     |
| Cyanobactéries toxigènes (mm3/L) | 1 mm3/L             | N.M.   | N.M.    | 0,026   | 0,173    | 0,111    | 0,099   | 0,502   | 1,24    | 4,54     | 1,07     |
| Microcystines (µg/L)             | 0,3 µg/L            | N.M.   | N.M.    | N.M.    | N.M.     | N.M.     | N.M.    | N.M.    | 0,63    | 0,90     | 2,98     |
| Anatoxine A (µg/L)               | Limite de détection | N.M.   | N.M.    | N.M.    | N.M.     | N.M.     | N.M.    | N.M.    | <0,15   | <0,15    | <0,15    |
| Cylindrospermopsine (µg/L)       | 42 µg/L             | N.M.   | N.M.    | N.M.    | N.M.     | N.M.     | N.M.    | N.M.    | <2,50   | <2,50    | <2,50    |
| Saxitoxine (µg/L)                | 30 µg/L             | N.M.   | N.M.    | N.M.    | N.M.     | N.M.     | N.M.    | N.M.    | <2,20   | <2,20    | <2,20    |
| Interprétation sanitaire         |                     |        |         |         |          |          |         |         |         |          |          |

N.M. : non mesuré ; N.D. : non détecté

L'ARS Bretagne assure le suivi des cyanobactéries en complément du contrôle bactériologique car certains genres sont susceptibles de produire des toxines pouvant causer des troubles de santé chez l'homme et les animaux. Ce suivi est déclenché uniquement si la concentration en chlorophylle A dépasse les 10 µg/L signifiant le début d'un développement de phytoplancton.

Les mesures de gestion sont graduées en fonction de la présence de cyanobactéries toxigènes dans l'eau :

 Chlorophylle a < 10 µg/L  
ou absence de genres toxigènes  
ou présence de genres toxigènes < 1 mm3/L

PAS D'ALERTE

Maintien d'une activité normale

 Présence de genres toxigènes > 1 mm3/L  
avec concentrations en toxines < Valeurs guides

NIVEAU ALERTE 1

Maintien d'une activité normale  
Information du public

 Présence de genres toxigènes > 1 mm3/L  
avec concentrations en toxines > Valeurs guides  
ou présence d'accumulation en surface et/ou mortalité animale

NIVEAU ALERTE 2

Interdiction de la baignade  
Restriction des activités nautiques  
Recommandations de non-consommation des poissons  
Information du public

